



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)**

Главам муниципальных
образований
Иркутской области
(по списку)

**УПРАВЛЕНИЕ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

Иркутск 23, а/я 85, 664023
тел. 8(3952) 559-518
E-mail: rshn12@fsvps.gov.ru
https: 38.fsvps.gov.ru

20.01.2026 № УФС-АЛ-04/358

На _____ от _____
«О направлении информации»

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» информирует, что Приказом Министерства сельского хозяйства от 19 декабря 2011 года № 476 утвержден перечень заразных. В том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), в том числе по болезни Марека.


В настоящее время в информационных мессенджерах массово распространяются объявления о продаже птицы и инкубационного яйца сомнительного происхождения. В связи с этим, Управление направляет информацию (приложение к письму), которую необходимо довести до сведения граждан и заинтересованных лиц с целью предотвращения и нераспространения болезни Марека.

Обо всех случаях выявления птиц с подозрением на заболевание (при наличии перечисленных признаков) необходимо сообщить в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия (3952) 55-95-18; в Службу ветеринарии Иркутской области (3952) 25-23-69.


Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. руководителя

Исп.: Л.П. Беганцова
8(3952) 559-518 (доб.01208)



А.А. Лим



Болезнь Марека является распространенным вирусным заболеванием, которое вызывается вирусом герпеса. Заболевание названо в честь Йозефа Марека, который первым описал его в 1907 году. Болезнь Марека распространяется через лимфатическую ткань и оказывает эффект на кожу, нервы и органы, вызывает опухоли в почках, печени, селезенке, легких, сердце и яичнике. Птенцы старше шести недель могут быть поражены вирусом, но чаще он встречается у кур в возрасте от 12 до 28 недель. Возбудитель болезни — онкогенный клеточносвязанный ДНК-содержащий вирус герпеса группы В. Вирус содержит ДНК, сохраняется недолго при температуре 18–20°, но при замораживании до — 180° остается вирулентным длительное время.

Подвержены заражению: Куры. Экономический ущерб: определяется высокой выбраковкой кур, падением яйценоскости, затратами на проведение карантинных мероприятий.

Симптомы: Заболевание распространено у кур в возрасте от 12 до 28 недель. Они быстро худеют и слабеют, в то время как хорошо едят. Паралич ног или крыльев. Иногда, сначала парализует одну ногу, а другую позже.

Источником болезни являются больные и здоровые куры — вирусоносители выделяющие вирус с пометом и секретами в окружающую среду. Факторами передачи являются — пыль, перья, вода, корм, инвентарь для

ухода, насекомые. Естественное заражение происходит главным образом аэрогенным путем.

Область поражения: кожа, нервная система, органы.

Причины: Вирус Герпеса с инкубационным периодом от двух недель, что находится в фолликулах перьев, сброшенных в период линьки и загрязняющих окружающую среду.

Методы передачи заболевания: Контакт с носителями (куры могут переносить Марека, не проявляя симптомов), через перхоть, грязную подстилку, пыль в курятнике. Заболевание Марека может выживать в пыли в течение года. Заболевание не воздействует на яйца инфицированной особи, но молодняк быстро подхватит болезнь в грязной окружающей среде.

Профилактика:

Содержите жилую зону в чистоте и старайтесь содержать цыплят и молодняк отдельно от взрослых птиц, чтобы удалить их из зоны риска, пока те не сформируют хоть какой-то иммунитет. Возможна вакцинация, хотя не все вакцины защищают от шести штаммов Марека и не всегда предотвращают заболевание с более вирулентными штаммами, которые могут появиться у птиц. Стресс является главным фактором, вызывающим заболевание, поэтому постарайтесь держать птиц спокойными.

Меры борьбы. При установление диагноза на болезнь Марека в хозяйстве:

запрещается реализация инкубационных яиц и живой птицы; прекращается инкубация и прием на выращивание молодняка птицы;

всю птицу неблагополучных птичников, цехов, ферм убивают на птицебойне хозяйства или на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности;

проводят тщательную очистку и дезинфекцию инкубатория, птичников, подсобных помещений, оборудования, инвентаря, прилегающей территории.

Ограничения с хозяйства снимают при отсутствии заболевания болезнью Марека птицемолодняка, выращенного в этом хозяйстве до 6-месячного возраста.

При установлении единичных случаев болезни Марека и отсутствии тенденции ее к распространению в хозяйстве проводят систематическую выбраковку и убой всей больной и подозрительной в заболевании птицы, осуществляют комплекс общих санитарных и ветеринарных мер по ликвидации и предупреждению распространения заболевания.

Если заболевание не проявляет тенденций к широкому распространению, из таких хозяйств разрешают реализацию инкубационных яиц после их дезинфекции парами формальдегида, а также реализацию суточного молодняка, вакцинированного против болезни Марека, в хозяйства с аналогичной эпизоотической ситуацией по болезни Марека. Ограничения с хозяйства снимают при отсутствии заболевания птицы болезнью Марека.

При убое птиц из птичников, неблагополучных по болезни Марека, проводят полное потрошение тушек, все внутренние органы утилизируют, а тушки выпускают в сеть общественного питания или используют для приготовления вареных колбас или консервов. При наличии опухолей в коже или мышцах тушки направляют на техническую утилизацию.

Пух, перо, полученные при убое больной или подозрительной по заболеванию птицы, дезинфицируют в соответствии инструкцией.

Риск для здоровья человека: Не известен.

Болезнь Марека входит в перечень заразных заболеваний.

